

| レジメン名 | 一般名 | 投与量 | 投与経路・時間 | 投与日数 | 1クール |
|-------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|------|
| EC | エピルビシン | 90 mg/m ² | 15分 | d1 | 21日 |
| | シクロホスファミド | 600 mg/m ² | 15分 | d1 | |
| AC | ドキソルビシン | 60 mg/m ² | 15分 | d1 | 21日 |
| | シクロホスファミド | 600 mg/m ² | 15分 | d1 | |
| 3wHER+3wDOC | トラスツズマブ | 6mg/kg (初回8mg/kg) | 90→30分 | d1 | 21日 |
| | ドセタキセル | 75 mg/m ² | 60分 | d1 | |
| wHER+3wDOC | トラスツズマブ | 2mg/kg (初回4mg/kg) | 90→30分 | d1,8,15 | 21日 |
| | ドセタキセル | 75 mg/m ² | 60分 | d1 | |
| wHER+wPTX | トラスツズマブ | 2mg/kg (初回4mg/kg) | 90→30分 | d1 | 7日 |
| | パクリタキセル | 80 mg/m ² | 60分 | d1 | |
| 3wPER+3wHER+3wDOC | ペルツズマブ | 420 mg/body (初回840 mg/body) | 60→30分 | d1 | 21日 |
| | トラスツズマブ | 6mg/kg (初回8mg/kg) | 90→30分 | d1 | |
| | ドセタキセル | 75 mg/m ² | 60分 | d1 | |
| | | | 90→30分 | | |
| 3wTC | シクロホスファミド | 600 mg/m ² | 15分 | d1 | 21日 |
| | ドセタキセル | 75 mg/m ² | 60分 | d1 | |
| XEL+PTX | パクリタキセル | 80 mg/m ² | 60分 | d1,8,15 | 28日 |
| | カペシタビン | 1657mg/m ² /day | 朝夕食後 | d1-21 | |

| レジメン名 | 一般名 | 投与量 | 投与経路・時間 | 投与日数 | 1クール |
|------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|------|
| wHER+CBDCA+3wPTX | トラスツズマブ | 2mg/kg (初回4mg/kg) | 90→30分 | d1,8,15 | 21日 |
| | パクリタキセル カルボプラチン | 175 mg/m2 AUC 6 | 180分 60分 | d2 d2 | |
| wHER+CBDCA+3wDOC | トラスツズマブ | 2mg/kg (初回4mg/kg) | 90→30分 | d1,8,15 | 21日 |
| | ドセタキセル カルボプラチン | 75 mg/m2 AUC 6 | 60分 60分 | d1 d1 | |
| wHER+GEM | トラスツズマブ | 2mg/kg (初回4mg/kg) | 90→30分 | d1,8,15 | 21日 |
| | ゲムシタビン | 1250 mg/m2 | 30分 | d1,8 | |
| wHER+VNB | トラスツズマブ | 2mg/kg (初回4mg/kg) | 90→30分 | d1,8,15 | 21日 |
| | ビノレルビン | 25 mg/m2 | 数分5分以内 | d1,8 | |
| 3wHER+VNB | トラスツズマブ | 6mg/kg (初回8mg/kg) | 90→30分 | d1 | 21日 |
| | ビノレルビン | 25 mg/m2 | 数分5分以内 | d1,8 | |
| 3wHER+HAL | トラスツズマブ | 6mg/kg (初回8mg/kg) | 90→30分 | d1 | 21日 |
| | エリブリン | 1.4mg/m2 | 5分 | d1,8 | |
| 3wHER+XEL | トラスツズマブ | 6mg/kg (初回8mg/kg) | 90→30分 | d1 | 21日 |
| | カペシタビン | 2500 mg/m2/da | 朝夕食後 | d1-14 | |
| wHER+XEL | トラスツズマブ | 2mg/kg (初回4mg/kg) | 90→30分 | d1,8,15 | 21日 |
| | カペシタビン | 2500 mg/m2/da | 朝夕食後 | d1-14 | |

| レジメン名 | 一般名 | 投与量 | 投与経路・時間 | 投与日数 | 1クール |
|-------------|-------------------|----------------------|-----------|---------|------------------|
| PTX(80)+BEV | ベバシツマブ | 10mg/kg | 90→60→30分 | d1,15 | 28日 |
| | パクリタキセル | 80 mg/m2 | 60分 | d1,8,15 | |
| KAD(3w) | トラスツズマブ-エムタンシン | 3.6mg/kg | 90→30分 | d1 | 21日 |
| 3wDOC(75) | ドセタキセル | 75 mg/m2 | 60分 | d1 | 21日 |
| 3wDOC(60) | ドセタキセル | 60 mg/m2 | 60分 | d1 | 21日 |
| 3wHER | トラスツズマブ | 6mg/kg (初回8mg/kg) | 90→30分 | d1 | 21日 |
| wHER | トラスツズマブ | 2mg/kg (初回4mg/kg) | 90→30分 | d1 | 7日 |
| HAL | エリブリン | 1.4mg/m2 | 5分 | d1,8 | 21日 |
| wPTX(80) | パクリタキセル | 80 mg/m2 | 60分 | d1 | 7日 |
| GEM+3wPTX | パクリタキセル | 175 mg/m2 | 180分 | d1 | 21日 |
| | ゲムシタビン | 1250 mg/m2 | 30分 | d1,8 | |
| GEM(1250) | ゲムシタビン | 1250 mg/m2 | 30分 | d1,8 | 21日 |
| nab-PTX | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 260 mg/m2 | 30分 | d1 | 21日 |
| VNB | ビノレルビン | 25 mg/m2 | 急速静注5分以内 | d1,8 | 21日 |
| CPT-11 | イリノテカン | 100 mg/m2 | 90分 | d1,8,15 | 35日 |
| FAS | フルベストラント | 500 mg/body | 筋注 | d1 | 28日 (初月のみ14日) |
| FEC | 5-フルオロウラシル | 500 mg/m2 | 15分 | d1 | 21日 |
| | エピルビシン | 100 mg/m2 | 15分 | d1 | |
| | シクロホスファミド | 500 mg/m2 | 15分 | d1 | |
| cCMF | シクロホスファミド | 100 or 150 mg/kg | 経口 | d1-14 | 28日 |
| | メソトレキサート | 40 mg/m2 | 15分 | d1,8 | |
| | 5-フルオロウラシル | 500 mg/m2 | 15分 | d1,8 | |